

Ärztliche Leiterin:
Frau Dr. Suanne Feidicker

Studienkoordinatorin:
Angelika Schmidt

Telefonnummer bei Rückfragen:
0421-6102-1256

Studiename	Studienbezeichnung
Tabea	Eine randomisierte, Phase-3-Studie zur Bestimmung der Effektivität von Taxane und Bevacizumab ± Capecitabin als Erstlinientherapie der Patientinnen mit HER2-negativem metastasierten Brustkrebs.
BCP	Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft.
Registerstudie Mammakarzinom des Mannes	Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms bei männlichen Patienten.
MALE	Eine prospektive, randomisierte, multizentrische Phase II Studie zur Evaluierung der Östradiol-suppression unter Tamoxifen allein versus Tamoxifen plus GnRH-Analogen versus Aromatase-Inhibitor plus GnRH-Analogen in der (Neo-) Adjuvanten und palliativen Therapie männliche Patienten mit Brustkrebs.

AGO-OVAR 2.21	Eine multi-nationale randomisierte, klinische Prüfung Phase III zum Vergleich zur nicht Unterlegenheit von Bevacizumab zu Gemcitabine/Carboplatin vs. Pegylated liposomal Doxorubicin/Carboplatin bei Patienten mit rezidivierendem Ovarial, Fallopian tube oder Peritoneal-Carcinom Empfindlichkeit auf platin-basierte Therapie.
Otilia (NIS)	Eine nicht-interventionelle Studie, dient der Erfassung von Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Avastin (Angiogenesehemmer Bevacizumab). Unter Studienbedingungen wird Avastin mit einer Chemotherapie kombiniert. Neu diagnostizierter fortgeschrittener Eierstocks- bzw. Eileiterkrebs nachgewiesene Peritonealcarcinose.
INSEMA	Vergleich der axillären Sentinel-Lymphknotenbiopsie versus keiner Axilla-Operation bei Patientinnen mit invasiven Mammakarzinom (Stadium I und II) und brusterhaltender Therapie: Eine prospektiv-randomisierte, operative Studie.
Löwenkids	Langzeitstudie zur Entwicklung des Immunsystems von Kindern. Um den Einfluss von Infektionen und Impfungen in den ersten Lebensjahren auf die Entstehung von chronischen Erkrankungen zu erforschen.

BRAWO	Postmenopausale Patientinnen mit HR positiv, Her2neu negativ, fortgeschrittenem Mammakarzinom ohne Symptomatische viszerale Metastasierung, die gemäß Praxisroutine mit Afinitor in Kombination mit Exemestan behandelt werden, nachdem es einen Rezidiv oder eine Progression nach einem nicht-steroidalen Aromataseinhibitor gekommen ist.
Register Studie für Patientinnen mit Gehirn Metastasen	Eine prospektive Registerstudie der Universitätsklinik GBG zur Diagnostik und Therapie.