

**Ärztliche Leiterin:**  
**Frau Dr. Karen Wimmer**

**Studienkoordinatorin:**  
**Stephanie Meining**

**Telefonnummer bei Rückfragen:**  
**0421-6102-1256**

Studiename	Studienbezeichnung
Randomisierte Studie:	
Trudy (Destiny) Studie	Eine multizentrische, randomisierte, offene, aktiv-kontrollierte Phase-3-Studie bei der die Therapien Trastuzumab Deruxtecan (T-Dxd) und Trastuzumab Emtansin (T-DM1) bei Hochrisikopatientinnen mit Her2neu positivem Brustkrebs im Frühstadium mit invasiver Resterkrankung in der Brust und/oder regionaler Lymphknoten nach neoadjuvanter Therapie verglichen werden.
Registerstudien:	
BreastCancerPregnancy	Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft.
Brainmet	Prospektive und Retrospektive Registerstudie von Patientinnen mit Hirnmetastasen bei Brustkrebs.
Eleanor	Eine Beobachtungsstudie mit triple positiven Patientinnen (Her2neu +, Östrogen und/oder Progesteron +) in einem frühen Brustkrebsstadium (I-III), nach Abschluss einer Trastuzumab-basierten Therapie vor <Jahr, die eine extendierte Her2neu basierte, adjuvante Neratinib Therapie erhalten.
Score	Identifikation von Faktoren zur Ermittlung eines Scores für die Vorhersage der Non-Compliance in der Routinetherapie des rezidivierenden Ovarialkarzinoms mit Ovastat (Treosulfan). Keine weiteren Ein- oder Ausschlusskriterien.

Carolin meets Hanna / Expression VI Ovar	Weltweite Umfrage von langzeitüberlebenden Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkrebs via Internet oder Papier
Palliative Studien:	
DETECT V	Eine multizentrische, randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemo- versus einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab)/ Perjeta® (Pertuzumab)-Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem und hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs.
Follow Up:	
INSEMA	Vergleich der axillären Sentinel-Lymphknotenbiopsie versus keiner Axilla-Operation bei Patientinnen mit invasiven Mammakarzinom (Stadium I und II) und brusterhaltender Therapie: Eine prospektiv- randomisierte, operative Studie.
Otilia (NIS)	Eine nicht-interventionelle Studie, dient der Erfassung von Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Avastin (Angiogenesehemmer Bevacizumab). Unter Studienbedingungen wird Avastin mit einer Chemotherapie kombiniert.  Neu diagnostizierter fortgeschrittener Eierstocks- bzw. Eileiterkrebs nachgewiesene Peritonealcarcinose.
Ribanna	Eine nicht interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/Her2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine.

SenTa	Prospektive, multizentrische, Registerstudie zur Anwendungshäufigkeit und Durchführbarkeit einer gezielten, axillären Lymphknoten-Exzision (Targeted Axillary Dissection) nach Stanzbiopsie und Clipmarkierung beim primären Mammakarzinom mit klinisch suspekten Lymphknoten. Pat. geplant zur NACT wie auch primär zu operierende Patientinnen
-------	--