Rekrutierende Studien

Indikation	Kurztitel	Titel	Inter-ventionelle Studie	Nicht interventionelle Studie	Sponsor
ALL	GMALL 08/2013	Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensivierte Therapie EudraCT: 2013-003466-13	**X**		Goethe-Universität Frankfurt Dekan des Fachbereichs Medizin Theodor Stern Kai 7 60590 Frankfurt/Main
CLL	CLL 17	A phase 3 multicentra, randomized, prospective, open-label trail of Ibrutinib monotherapie vs. fixed-duration Venetoclax plus Obinutuzumab vs. fixed-duration Venetoclax plus Ibrutuinib in patients with previously untreted chronic lymphocytc leukaemia (CLL) EudraCT: 2019-003854-99 Eine multizentrische, randomisierte, prospektive, offenr Phase-III-Studie der Ibrutinib-Monotherapie vs. Venetoclax mit Obinutuzumab vs. Venetoclax plus Ibrutuinib bei Patienten mit zuvor nicht behandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL)	**X**		Universität Köln Albert-Magnus-Platz 50923 Köln
DLBCL	POLA-R-ICE	An open-label, prospective Phase III clinical study to compare Polatuzumab vedotin plus Rituximab, Ifosphamide, Carboplatin and Etoposide 8POLA-R-ICE) with Rituximab, Ifosphamide, Carboplatin and Etoposide (R-ICE) alone as salvage therapy in patients with primary refractory or relapsed diffuse large B-Cell Lymphoma (DLBCL) EudraCT 2019-002962-10	**X**		GWT-TUD GmbH Freiberger Strasse 33 01067 Dresden

		Eine offene, prospektive klinische Phase-III-Studie zum Vergleich von Polatuzumab Vedotin plus Rituximab, Ifosphamid, Carboplatin und Etoposid (POLA-R-ICE) mit Rituximab, Ifosphamid, Carboplatin und Etoposid (R-ICE) allein als Salvage-Therapie bei Patienten mit primär refraktärer oder rezidiviertes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL)			
Gastrointes-tinale Tumore	PLATON	Eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie mit Biobanking und Etablierung einer interaktiven ärztlichen Diskussions-Plattform, zur Evaluierung genetischer Tumorprofile, assoziierter Therapieentscheidungen und der Überlebenszeit bei gastrointestinalen Tumoren		**X**	The Palton Network Krankenhaus Nordwest Frankfurt
Morbus Hodgkin	HD 21 für fortgeschrittene Stadien	Therapieoptimierung in der Primärtherapie des fortgeschrittenen Hodgkin Lymphoms Vergleich 6 Zyklen BEACOPP eskaliert mit 6 Zyklen BrECADD, Rekrutierung nur offen für ältere Patienten 61-75 Jahre EudraCT: 2014-005130-55	**X**		Universitätsklinik Köln
	C-ZAR-1	Efficacy and safety of Carfilzomib in combination with Ibrutinib vs. Ibrutinib alone in Waldenström´s Macroglobulinemia EudraCT 2018-003526-88 Wirksamkeit und Sicherheit von Carfilzomib in Kombination mit Ibrutinib vs. Ibrutinib Monotherapie bei M. Waldenström	**X**		Universitätsklinikum Ulm
Register	AML	SAL-AML-Register		**X**	Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus Dresden
	MPN	SAL-MPN-Register		**X**	Medizinische Fakultät RWTH Aachen
	ALL	GMALL-Register		**X**	Universitätsklinikum Frankfurt/Main

	PTLD	PTLD-Register der DPTLGSG		**X**	Ev. Diakonie-Krankenhaus Bremen
	CLL	CLL-Register		**X**	UK Köln
	EWING-Sarkome	Internationales Euro Ewing Register		**X**	UK Essen
Studien in der Nachbeobachtungsphase (Follow up)					
CML	CML V (TIGER)	Treatment optimization of newly diagnosed Ph/BCR-ABL positive patients with chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase with nilotinib vs. nilotinib plus interferon alpha induction and nilotinib or interferon alpha maintenance therapy EudraCT-Nr. 2010-024262-22 Behandlungsoptimierung der neu diagnostizierten Ph / BCR-ABL-positiven Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen Phase mit Nilotinib gegen Nilotinib plus Interferon alpha Induktion und Nilotinib oder Interferon alpha Erhaltungstherapie	**X**		Friedrich Schiller Universität Jena
M. Waldenström	ECWM-1	Wirksamkeit der Erstlinientherapie mit Medikation von Dexamethason, Rituximab und Cyclophosphamid (DRC) +/- Bortezomib bei Patienten mit Morbus Waldenström EudraCT-Nr. 2013-000506-37	**X**		Universitätsklinikum Ulm
M. Waldenström	ECWM-2	Efficacy of first line Bortezomib, Rituximab, Ibrutinib (B-RI) for patients with treatment naïve Waldenström´s Macroglobuinemia EudraCT 2017-004362-95 Wirksamkeit von Bortezomib, Rituximab und Ibrutinib (B-RI) der ersten Wahl bei Patienten mit unbehandelter Waldenström-Makroglobuinämie	**X**		Universitätsklinikum Ulm

Low Grade NHL	CHOP +/- Anti CD 20 + Hochdosistherapie vs. IFN-Erhaltung	Prospektiv randomisierte Prüfung des kurativen Potentials von myeloablativer Radio-Chemotherapie mit peripherer Stammzelltransplantation im Vergleich zu konventioneller Erhaltungstherapie mit Interferon alpha nach initialer zytoreduktiver Chemotherapie mit CHOP vs CHOP + Anti-CD 20	**X**		Klinikum der Universität München Med. Klinik und Poliklinik III
CLL	CLL 12	Eine placebo-kontrollierte, doppelblinde, randomisierte multizentrische dreiarmige Phase III Studie zur Effektivität und Sicherheit von Ibrutinib vs. Placebo bei unbehandelten CLL Patienten im Stadium Binet A mit Risiko für einen frühen Krankheitsprogress EudraCT-Nr. 2013-003211-2	**X**		Universität zu Köln Albertus Magnus-Platz 50923 Köln
CLL 1.line	CLL 13	A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard Chemotherapy (FCR/BR) versus Rituximab plus Venetoclax (RVe) versus Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (GVe) versusu Obinutuzumab plus Ibrutinib plus venetoclax (GIVe) in fit patients with with previously untreated chronic lymphocytic leukemia (CLL) without del (17p) or TP53 mutation EudraCT: 2015-004936-36 Eine Phase 3 multizentrische, randomisierte, prospektive, offene Studie zur Standard-Chemotherapie (FCR / BR) gegenüber Rituximab plus Venetoclax (RVe) gegen Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (GVe) versus Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax (GIVe) bei fitten Patienten mit bisher unbehandelter chronisch lymphatischer Leukämie (CLL) ohne Del (17p) oder TP53-Mutation	**X**		Universität zu Köln Albertus Magnus-Platz 50923 Köln
Follikuläre Lymphome non-fit patients	GABE 2016	First line Therapy of advanced stage follicular Lymphoma <60 years not eligible for standard Immunochemotheraphy and in all patients >/= 60 years Prospective randomized evaluation of single agent GA101 versus GA 101 plus Bendamustin followed by GA101 EudraCT: 2016-000755-27	**X**		Klinikum der Universität München

		First-Line-Therapie des follikulären Lymphoms im fortgeschrittenen Stadium <60 Jahre, die nicht für eine Standard-Immunchemotherapie geeignet sind, und bei allen Patienten >/= 60 Jahre Prospektive randomisierte Bewertung des Einzelwirkstoffs GA101 gegenüber GA 101 plus Bendamustin, gefolgt von GA101			