

**Ärztliche Leiterin:**  
**Frau Dr. Karen Wimmer**

**Studienkoordinatorin:**  
**Angelika Schmidt**

**Telefonnummer bei Rückfragen:**  
**0421-6102-1256**

Studiename	Studienbezeichnung
Registerstudien:	
BreastCancerPregnancy	Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft.
Registerstudie Mammakarzinom des Mannes, MALE	Prospektive Registerstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms bei männlichen Patienten.
Brainmet	Prospektive und Retrospektive Registerstudie von Patientinnen mit Hirnmetastasen bei Brustkrebs.
SenTa	Prospektive, multizentrische, Registerstudie zur Anwendungshäufigkeit und Durchführbarkeit einer gezielten, axillären Lymphknoten-Exzision (Targeted Axillary Dissection) nach Stanzbiopsie und Clipmarkierung beim primären Mammakarzinom mit klinisch suspekten Lymphknoten. Pat. geplant zur NACT wie auch primär zu operierende Patientinnen
Score	Identifikation von Faktoren zur Ermittlung eines Scores für die Vorhersage der Non-Compliance in der Routinetherapie des rezidivierenden Ovarialkarzinoms mit Ovastat (Treosulfan). Keine weiteren Ein- oder Ausschlusskriterien.
Carolin meets Hanna / Expression VI Ovar	Weltweite Umfrage von langzeitüberlebenden Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkrebs via Internet oder Papier

Ribanna	Eine nicht interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/Her2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine.
Chirurgische Studien:	
INSEMA	Vergleich der axillären Sentinel-Lymphknotenbiopsie versus keiner Axilla-Operation bei Patientinnen mit invasiven Mammakarzinom (Stadium I und II) und brusterhaltender Therapie: Eine prospektiv-randomisierte, operative Studie.
Palliative Studien:	
DETECT V	Eine multizentrische, randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemo- versus einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab)/Perjeta® (Pertuzumab)-Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem und hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs.
Follow Up:	
Otilia (NIS)	Eine nicht-interventionelle Studie, dient der Erfassung von Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Avastin (Angiogenesehemmer Bevacizumab). Unter Studienbedingungen wird Avastin mit einer Chemotherapie kombiniert.  Neu diagnostizierter fortgeschrittener Eierstocks- bzw. Eileiterkrebs nachgewiesene Peritonealcarcinose.
AGO-OVAR 2.21	Eine multi-nationale randomisierte, klinische Prüfung Phase III zum Vergleich zur nicht Unterlegenheit von Bevacizumab zu

	Gemcitabine/Carboplatin vs. Pegylated liposomal Doxorubicin/Carboplatin bei Patienten mit rezidivierendem Ovarial, Fallopian tube oder Peritoneal-Carcinom Empfindlichkeit auf platin-basierte Therapie.
MALE	Eine prospektive, randomisierte, multizentrische Phase II Studie zur Evaluierung der Östradiol-suppression unter Tamoxifen allein versus Tamoxifen plus GnRH-Analogen versus Aromatase-Inhibitor plus GnRH-Analogen in der (Neo-) Adjuvanten und palliativen Therapie männliche Patienten mit Brustkrebs.
BRAWO	Postmenopausale Patientinnen mit HR positiv, Her2neu negativ, fortgeschrittenem Mammakarzinom ohne Symptomatische viszerale Metastasierung, die gemäß Praxisroutine mit Afinitor in Kombination mit Exemestan behandelt werden, nachdem es einen Rezidiv oder eine Progression nach einem nicht-steroidalen Aromataseinhibitor gekommen ist.